

Caladryl[®]

Loción


Difenhidramina HCl Calamina

Venta libre - INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR CALADRYL[®].
Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

¿Qué contiene CALADRYL[®]?

Principios activos: Difenhidramina Clorhidrato 1,000 g y Calamina 8,133 g (óxido de zinc; óxido de hierro rojo; óxido de hierro amarillo). Ingredientes inactivos: alcohol, carboximetilcelulosa, perfume, glicerina, alcanfor, agua purificada. Acción: antihistamínico, antialérgico, antipruriginoso.



¿Para qué se utiliza CALADRYL[®]?

Alivio temporario de la picazón, inflamación y dolor asociado con irritaciones menores de la piel de causa alérgica, erupciones, picaduras, quemaduras leves de sol y en general y sarpullido estival. No mancha la ropa.

¿Cómo se utiliza CALADRYL[®]?

Extender sobre el área de piel afectada, 3 a 4 veces por día. Antes de aplicar, lavar la piel con agua y jabón y secar. Para uso en adultos y niños mayores de 2 años. Menores de 2 años, consultar con el médico. Si los síntomas persisten o empeoran luego de los 7 días, consulte con el médico.

¿Qué personas no pueden utilizar CALADRYL[®]?:

NO USE este medicamento:

- Si es alérgico a algunos de sus componentes.
- Si está embarazada o amamantando.
- Simultáneamente con otros productos que contengan difenhidramina, incluso si es de uso oral.
- Si presenta lesiones en áreas extensas de la piel.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar CALADRYL[®]?

Consulte a su médico antes de utilizar CALADRYL[®] si Ud.:

- Tiene varicela o sarampión.
- La piel tiene ampollas o alguna lastimadura que supura.

Si usted está embarazada o sospecha estarlo.

¿Qué cuidados debo tener mientras utilizo CALADRYL[®]?

Evite el contacto con los ojos o mucosas. Suspenda el uso si tiene sensación de ardor, si aparece sarpullido o si persisten los síntomas. Usar agua y jabón para removerlo. SOLO USO EXTERNO.

Caladryl[®]

Loción

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si se aplicó más cantidad de la necesaria o ingesta accidental?

Busque asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones inmediatamente:

• Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247. • Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/(011) 4658-7777. • Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA). Anmat responde: 0800-333-1234.

Presentación:

Envase conteniendo 100 mililitros.

¿Cómo guardar este medicamento?

Conservar entre 15°C y 30°C, en el envase perfectamente cerrado. Proteger de la luz y de congelamiento.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Bajo Lic. W.L.



Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A.,
Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Bajo Lic. exclusiva de Warner Lambert Co., USA.

Certificado N° 14.100. DT: Farm. Laura A. B. Hernández.

Fecha de última revisión: Septiembre / 2019. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532** | elea.com